



۹۷/۴/۱۵

## بِنَامِ آنکه جان را فلز آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعاونت آموزشی

دیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی  
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۹۷-۹۸

### سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

روشه

## آمار زیستی

|                |           |                     |  |
|----------------|-----------|---------------------|--|
| تعداد سوالات:  | ۱۱۰       | مشخصات داوطلب:      |  |
| زمان پاسخگویی: | ۱۶۰ دقیقه | نام و نام خانوادگی: |  |
| تعداد صفحات:   | ۱۶        | شماره کارت:         |  |

آمار زیستی

#### داوطلب عزیز:

خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.

## ریاضی عمومی

-۱- اگر  $f(x) = \int_0^x e^t dt$  باشد  $(f'(x))'$  برابر است با:

(د)  $\frac{e}{\sqrt{x}}$

(ج)  $\frac{e}{2}$

(ب)  $2e$

(الف)  $e$

-۲- حاصل  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\cos x)^{\frac{1}{x}}$  برابر است با:

(د)  $e$

(ج)  $\frac{1}{\sqrt{e}}$

(ب)  $\frac{1}{e}$

(الف)  $\sqrt{e}$

-۳- در معادله  $p = \frac{e^{x+2}}{1+e^{x+2}}$  است مقدار  $x$  برابر است با:

(د)  $\ln(\frac{p+2}{1-p})$

(ج)  $\ln(\frac{p-2}{1-p})$

(ب)  $\ln \frac{p}{1-p} - 3$

(الف)  $\ln \frac{p}{1-p} - 3$

-۴- حاصل عبارت  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x}$  کدام است؟

(د)  $\frac{e}{2}$

(ب)  $e$

(الف)  $\frac{e}{2}$

-۵- اگر  $f(x, y) = e^{xy} + \sin xy$  در نقطه  $(1, 0)$  کدام است؟

(د)  $2e$

(ج)  $2$

(ب)  $1$

(الف)  $e$

-۶- حاصل  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \cos 2x}{\ln \cos 3x}$  برابر است با:

(د)  $\frac{2}{3}$

(ج)  $1$

(ب)  $\frac{3}{2}$

(الف)  $\frac{4}{9}$

-۷- حاصل  $\lim_{x \rightarrow \infty} (1+2x)^{\frac{1}{2x}}$  برابر است با:

(د)  $\frac{2}{3}e$

(ج)  $1$

(ب)  $\frac{3}{2}$

(الف)  $e$

-۸- بازه همگایی سری  $\dots + 3^9 x^9 + 3^4 x^4 + 3^3 x^3$  کدام است؟

(د) همگرا نیست

(ج)  $-\frac{1}{\sqrt{3}} < x < \frac{1}{\sqrt{3}}$

(ب)  $-3 < x < 3$

(الف)  $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}$

$$\begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = 1 \\ z = t \end{cases}$$

کدام است؟

(د) ۴

(ج) ۳

(ب) ۲

(الف) ۱



۱۰- مقدار  $\int_{0}^{2x} dx - 2 \int_{0}^x dx$  چقدر است؟

(۵) ۰/۲۵

ج) صفر

(۱) ۰/۵ ب) ۱-۲

### آمار ریاضی و احتمال

۱۱- احتمال موفقیت در آزمایشی برابر با  $P^n$  است احتمال اینکه در  $n$  بار انجام این آزمایش اقلایک بار موفقیت حاصل شود برابر است با:

(۵)  $P^n$ ج)  $(1-P)^n$ ب)  $1-(1-P)^n$ الف)  $1-P^n$ 

۱۲- اگر  $X_1, X_2, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی از توزیع نمایی باشد میانگین آماره ترتیبی اول (کمترین آنها) چقدر است؟

(۵)  $\frac{n-1}{n^2}$ ج)  $\frac{1}{n+1}$ ب)  $\frac{1}{n}$ الف)  $\frac{1}{n-1}$ 

۱۳- در توزیع در جمله‌ای  $X \sim \text{Bin}(3, P)$  فرض  $P = 0.1$  آزمون می‌کنیم. اگر  $H_0: P = 0.1$  و  $H_1: P = 0.3$  ملاک رد کردن  $H_0$  باشد احتمال خطای نوع اول چقدر است؟

(۵) ۰/۱۰

ج) ۰/۰۱

ب) ۰/۰۰۱

الف) ۰/۰۵

۱۴- سه مقدار  $x_1, x_2, x_3$  را از یک توزیع بیوسته به تصادف انتخاب نموده و آنها را از کوچک به بزرگ مرتب می‌کنیم چقدر احتمال دارد مقدار مرتب شده وسطی از میانگین دو مقدار دیگر بیشتر شود؟

(۵)  $\frac{1}{3}$ ج)  $\frac{2}{3}$ ب)  $\frac{1}{2}$ الف)  $\frac{1}{4}$ 

۱۵- یک نمونه  $n$  تایی با جایگذاری از جامعه‌ای به حجم  $N$  انتخاب می‌کنیم احتمال اینکه عضو معینی از جامعه در این نمونه باشد برابر است با:

(۵)  $1 - \left(\frac{N-1}{N}\right)^n$ ج)  $\left(\frac{N-1}{N}\right)^n$ ب)  $\frac{n}{N}$ الف)  $\frac{N-n}{N}$ 

۱۶- اگر  $T_1, T_2, \dots, T_k$  برآوردهای نااریب با کمترین واریانس (UMVUE) امید ریاضی‌های خود باشند کدام یک از گزینه‌های زیر UMVUE امید ریاضی خود خواهد بود؟

(۵)  $T' = \sum 2T_i^2$ ج)  $T' = \sum 2T_i$ ب)  $T' = \sum \frac{1}{T_i}$ الف)  $T' = \sum T_i^2$ 

۱۷- اگر متغیر تصادفی  $X$  دارای میانگین ۵ و واریانس ۴ باشد آنگاه  $P(|x-5| > 6) <$

الف) بزرگتر از  $\frac{1}{9}$  استب) کمتر یا مساوی  $\frac{1}{9}$  استج) بزرگتر از  $\frac{1}{3}$  استد) کوچکتر یا مساوی  $\frac{1}{3}$  است

۱۸- در یک مسیر دوچرخه رانی در سطح شهر تهران تعداد دوچرخه هایی که در مدت نیم ساعت از مسیر گذر می کنند دارای توزیع بواسن با پارامتر  $\lambda = 9$  است، احتمال زمان انتظار کمتر از ۵ دقیقه برای عبور یک دوچرخه سوار چقدر است؟

(d)  $1 - e^{-3}$

(ج)  $1 - e^{-\frac{1}{2}}$

(ب)  $1 - e^{-\frac{2}{3}}$

(الف)  $1 - e^{-\frac{3}{2}}$

۱۹- یک نمونه تصادفی پنج تایی از توزیع نرمال  $(\mu, \sigma^2)$  می گیریم فرض کنید  $T$  برآوردگر حداکثر درستنمایی برای  $\sigma^2$  باشد  $Var(T)$  برابر است با:

(د)  $\frac{\lambda}{5} \sigma^4$

(ج)  $\frac{25}{n} \sigma^4$

(ب)  $\frac{2}{5} \sigma^2$

(الف)  $\frac{2}{5} \sigma^4$

۲۰- یک نمونه تصادفی از توزیع  $(\mu, \sigma^2)$  می گیریم فرض کنید  $\bar{X}_w = \sum_{i=1}^n W_i X_i$  میانگین وزنی این نمونه باشد

$E(\bar{X}_w | \bar{X})$  برابر است با:

(د)  $\bar{X} + 1$

(ج)  $2\bar{X}$

(ب)  $\bar{X}$

(الف)  $\bar{X} - 1$

۲۱- اگر  $X_1, X_2, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی  $(n \geq 2)$  از توزیع نمایی با پارامتر  $\theta$  باشند و اگر  $T = (X_{(1)}, \sum(X_i - X_{(1)}))$  یک آماره بسنده مینیمال باشد کدامیک از توابع زیر برآوردگر نااریب  $\theta$  هستند؟ (مقدار مرتب شده اول است)

(الف)  $T' = \frac{n}{n+1} X_{(1)}$

(ب)  $T' = \frac{n+1}{n} X_{(1)}$

(ج)  $T' = \frac{n}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - X_{(1)})$

(د)  $T' = \frac{n-1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - X_{(1)})$

۲۲- فرض کنید  $X_1, X_2, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی از  $X$  با تابع چگالی  $f(x, \theta)$  باشد.

یک برآوردگر MLE برای پارامتر  $\theta$  کدام است؟

(د)  $\hat{\theta} = \bar{X} + 1$

(ج)  $\hat{\theta} = 1 - \frac{1}{\bar{X}}$

(ب)  $\hat{\theta} = \frac{1}{\bar{X}} - 1$

(الف)  $\hat{\theta} = \frac{1}{\bar{X}}$

۲۳- نمونه تصادفی  $x_1, x_2, \dots, x_n$  از توزیع برنولی با پارامتر  $P$  می باشد. برای آزمون  $H_0: P = P_0 = \frac{1}{4}$  در مقابل

$S = \sum_{i=1}^n x_i$  باشد، نسبت درستنمایی بر حسب  $S$  کدام است؟

(د)  $(\frac{3}{4})^S (\frac{1}{4})^{n-S}$

(ج)  $(\frac{3}{4})^S (\frac{1}{2})^{n-S}$

(ب)  $(\frac{1}{4})^S (\frac{3}{4})^{n-S}$

(الف)  $(\frac{1}{2})^S (\frac{3}{4})^{n-S}$

۲۴- فرض کنید  $X_1, X_2, X_3$  سه نمونه تصادفی از توزیع برنولی با پارامتر  $P$  باشد کدام یک از آماره‌های ذیل یک برآوردگر ناریب  $P$  است.

الف)  $2\bar{X} - \frac{5}{3}X_2 - \frac{X_3}{3}$

ب)  $\bar{X} - \frac{1}{3}X_1$

ج)  $\bar{X} + \frac{2}{3}X_2$

د)  $\bar{X} - \frac{5X_1}{3} - \frac{X_2}{3}$

۲۵- اگر  $(x, y)$  دارای تابع چگالی زیر باشد:

$$f(x, y) = e^{-\frac{x}{2}} - \frac{y}{2}$$

و دامنه  $X$  و  $Y$  مستقل از هم باشد در این صورت  $\text{Cov}(x, y)$  برابر است با:

۱)  $\frac{4}{3}$

۲)  $\frac{2}{3}$

۳)  $0$

الف) ۱

۲۶- فرض کنید  $X_1, X_2, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی از  $\text{Bin}(1, P)$  باشد؛ فرض اینکه  $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})$  و  $S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$  باشد؛ مقدار  $P(S^2 = \bar{X})$  برابر است با:

۱)  $1 + p^n$

۲)  $(1-p)^n$

۳)  $1 - p^n$

الف)  $P^n$

۲۷- فرض کنیم  $(x, y)$  دارای تابع چگالی احتمال زیر باشد

$$f(x, y) = e^{-x^2} y \quad ; \quad x \geq 0, y > 0$$

توزیع شرطی  $y$  به شرط  $x = X$  برابر است با:

الف)  $\text{Gamma}(2, x^2)$

ب)  $\text{Gamma}(x^2, 2)$

ج) نمایی منفی با پارامتر  $x$

د) نمایی منفی با پارامتر  $x^2$

۲۸- فرض کنیم  $X_1, X_2, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی از توزیع نرمال  $(\mu, \sigma^2)$  باشد که در آن  $\mu$  معلوم و  $\sigma^2$  مجہول است. اگر  $U = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$  و  $W = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$  دو برآوردگر برای  $\sigma^2$  باشند. کارائی  $U$  نسبت به  $W$  برابر است با:

۱)  $\frac{n^2}{n^2 - 1}$

۲)  $\frac{n^2}{1+n^2}$

۳)  $\frac{n}{n-1}$

الف)  $\frac{n}{n+1}$

۲۹- فرض کنید  $X_1, X_2, \dots, X_n$  نمونه‌ای تصادفی از توزیع پواسن با پارامتر  $\lambda$  باشد  $\text{Var}(E(S^2 | \bar{X}))$  برابر است با:

۱)  $\lambda$

۲)  $\frac{\lambda}{n^2}$

۳)  $\frac{\lambda}{n}$

الف)  $\frac{\lambda^2}{n}$

۳۰- اگر  $X \sim N(\mu, 1)$  باشد، برآوردگر نااریب پارامتر  $\mu = \alpha$  کدام است؟

- (a)  $\frac{1}{X^2}$       (b)  $\bar{X} + \frac{1}{n}$       (c)  $\bar{X} - \frac{1}{n}$

### روش‌های آماری

(شامل طرح آزمایش‌ها- رگرسیون- نمونه‌گیری- آمار ناپارامتری)

۳۱- اگر برآورد معادله خط رگرسیون بصورت  $\hat{y} = \hat{\beta}_1 x + \hat{\beta}_0$  باشد، آنگاه برآورد پارامترهای  $\beta_1$  و  $\beta_0$  کدام است؟

- (a)  $\hat{\beta}_1 = \bar{y}$ ,  $\hat{\beta}_0 = 1$   
(b)  $\hat{\beta}_1 = 1$ ,  $\hat{\beta}_0 = \bar{y}$   
(c)  $\hat{\beta}_1 = 0$ ,  $\hat{\beta}_0 = \bar{y}$   
(d)  $\hat{\beta}_1 = \bar{y}$ ,  $\hat{\beta}_0 = \bar{x}$

۳۲- از جامعه‌ای بزرگ، نمونه‌ای به حجم  $n=2$  انتخاب کرده‌ایم. مقادیر  $12$  و  $16$  مشاهده شده است. در این صورت برآورد نااریب واریانس جامعه برابر است با:

- (a)  $8$       (b)  $16$       (c)  $4$       (d)  $2$

۳۳- اگر در نمونه‌ای به حجم  $n=9$  که به روش تصادفی ساده بدون جایگذاری از جامعه‌ای به حجم  $N=90$  گرفته‌ایم. مجموع توان دوم مقادیر واحدهای نمونه برابر  $44$  و میانگین نمونه  $2$  باشد. آنگاه برآورد واریانس میانگین نمونه برابر است با:

- (a)  $\frac{1}{8}$       (b)  $\frac{8}{9}$       (c)  $\frac{8}{10}$       (d)  $\frac{1}{10}$

۳۴- اگر تعداد موفقیت در یک نمونه  $100$  نفره،  $60$  نفر باشد. مقدار آماره آزمون برای فرضیه  $H_0: P \geq 0.5$  چقدر است؟

- (a)  $1$       (b)  $2$       (c)  $-2$       (d)  $-1$

۳۵- در یک مدل رگرسیونی، اگر یک متغیر مستقل به مدل اضافه شود، ضریب تعیین تعدیل شده چه تغییری می‌کند؟

- (a) همواره افزایش می‌یابد.  
(b) همواره کاهش می‌یابد.  
(c) همواره ثابت می‌ماند.  
(d) لزوماً افزایش نمی‌یابد.

۳۶- در کدام یک از روش‌های مقایسه‌ای زوجی در تحلیل واریانس لازم است حجم نمونه در داخل گروه‌ها یکسان باشد؟

- (a) بونفرونی      (b) دانکن      (c) شفه      (d) توکی

۳۷- در برآورد یک فاصله اطمینان ۹۵ درصدی، اگر انحراف معیار دو برابر و حجم نمونه چهار برابر بیشتر شود، طول

فاصله اطمینان چه تغییری می‌کند؟

- (الف) نصف می‌شود.
- (ب) دو برابر می‌شود.
- (ج) چهار برابر می‌شود.
- (د) تغییر نمی‌کند.

۳۸- اگر در آزمون فرضیه  $\theta_2 = \theta_1$  در برابر  $\theta_1 \neq \theta_2$  احتمال خطای نوع اول ۰/۰۱ باشد، کدام گزینه صحیح است؟

- (الف) اگر واقعاً  $\theta_2 = \theta_1$  باشد، احتمال رد آن ۰/۰۱ است.
- (ب) اگر واقعاً  $\theta_2 \neq \theta_1$  باشد، احتمال رد آن  $\theta_2 = \theta_1$  برابر ۰/۰۱ است.
- (ج) اگر واقعاً  $\theta_2 = \theta_1$  باشد، احتمال رد  $\theta_2 \neq \theta_1$  برابر ۰/۰۱ است.
- (د) اگر واقعاً  $\theta_2 \neq \theta_1$  باشد، احتمال عدم رد  $\theta_2 = \theta_1$  برابر ۰/۰۱ است.

۳۹- برای رفع مشکل هم خطی در رگرسیون، کدام گزینه صحیح است؟

- (الف) اضافه کردن متغیرهای مستقل جدید به مدل
- (ب) حذف متغیرهای مستقلی که تابعی از متغیرهای مستقل دیگرند.
- (ج) انجام تبدیلات مناسب روی متغیر پاسخ
- (د) افزایش حجم نمونه

۴۰- اگر  $X_1, X_2, \dots, X_n$  مقادیر متغیر مستقل برای یک نمونه ۵۰ نفری باشند در برآورد میانگین متغیر پاسخ در مدل رگرسیونی به ازای چه مقدار خاصی از  $X$ . کمترین خطای روی می‌دهد؟

- (الف)  $\bar{X}$  (میانگین  $X$  ها)
- (ب) کمینه  $X$  ها
- (ج) بیشینه  $X$  ها
- (د)  $\bar{y}$

۴۱- در مدل رگرسیون خطی ساده  $y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \varepsilon$  با فرض این که  $\varepsilon$  ها مستقل و دارای توزیع  $N(0, \sigma^2)$  باشند و  $b_1$  و  $\sigma$  برآوردهای حداکثر درستنمایی پارامترهای  $\beta_1$  و  $\sigma$  باشند کدام گزینه درست است؟

- (الف)  $b_1$  و  $\sigma$  هر دو اریب هستند.
- (ب)  $b_1$  و  $\sigma$  هر دو نا اریب هستند.
- (ج)  $b_1$  اریب و  $\sigma$  نا اریب است.
- (د)  $b_1$  نا اریب اما  $\sigma$  اریب است.

۴۲- در مدل رگرسیونی  $y = \alpha + \beta X + \varepsilon$  اگر ضریب همبستگی بین  $X$  و  $Y$  باشد ضریب همبستگی بین  $Y$  و  $\hat{Y} = \hat{\alpha} + \hat{\beta} X$  برابر است با:

- (الف)  $r^2$
- (ب)  $|r|$
- (ج)  $\hat{r}$
- (د)  $\hat{\beta}$

۴۳- در مدل رگرسیون خطی ساده  $y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i$  پارامتر  $\beta_1$  معلوم است و پارامتر  $\beta_0$  به روش حداقل مربعات برآورد می‌شود. کدام گزینه همواره برابر صفر است؟ ( $e_i = y_i - \hat{y}_i$ )

(د)  $\sum e_i \hat{y}_i$

(ج)  $\sum e_i x_i$

(ب)  $\sum_{i=1}^n e_i y_i$

(الف)  $\sum_{i=1}^n e_i$

۴۴- یک وسیله آزمایشگاهی بطور متوسط دو بار در سال نیاز به تعمیر پیدا می‌کند. احتمال اینکه هر ۶ ماه حداقل یک بار تعمیر شود برابر است، با

(د)  $1 - e^{-2}$

(ج)  $1 - e^{-1}$

(ب)  $e^{-2}$

(الف)  $e^{-1}$

۴۵- در مدل رگرسیونی  $SS_{\text{Regression}} = 64$  ،  $SS_{\text{Total}} = 100$  ،  $y_i = \alpha + \beta x + \epsilon_i$  و  $\hat{\beta} = 2$  می‌باشد. ضریب همبستگی پاسخ و خطأ  $\text{corr}(y_i, e_i)$  چقدر است؟

(د)  $-0.16$

(ج)  $0.16$

(ب)  $-0.18$

(الف)  $0.18$

۴۶- فشار خون سیتولیک بر حسب سانتی متر جیوه ۵ نفر قبل و پس از مصرف دارویی به شرح جدول زیر است. براساس آزمون علامت (نشانه)، P-مقدار (P-value) آزمون تاثیر مثبت دارو بر فشار خون برابر است با:

|              |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|
| فشار خون قبل | ۱۱ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۲ |
| فشار خون بعد | ۱۲ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۴ |

(د)  $\frac{1}{5}$

(ج)  $\frac{3}{22}$

(ب)  $\frac{3}{8}$

(الف)  $\frac{3}{16}$

۴۷- با در نظر گرفتن میانه به عنوان نقطه برش، تعداد گردش‌ها (Run) در نمونه ۱۶ و ۲۱ و ۱۹ و ۱۸ و ۱۵ و ۲۳ برابر است با:

(د) ۲

(ج) ۶

(ب) ۴

(الف) ۳

۴۸- اگر متغیر وابسته  $y$  دو حالته ۰ و ۱ و  $P(y=1) = p$  باشد، ضریب  $\beta_1$  در مدل آماری  $\ln(\frac{p}{1-p}) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$  چگونه تفسیر می‌شود؟

(الف) تغییر  $y$  را به ازای یک واحد افزایش در  $X_1$  نشان می‌دهد.

(ب) تغییر میانگین  $y$  را به ازای یک واحد افزایش در  $X_1$  نشان می‌دهد.

(ج) تغییر  $\ln(\frac{p}{1-p})$  را به ازای یک واحد افزایش در  $X_1$  نشان می‌دهد.

(د) تغییر  $\frac{p}{1-p}$  را به ازای یک واحد افزایش در  $X_1$  نشان می‌دهد.

۴۹- رگرسیون خطی  $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i$  را در نظر بگیرید. اگر  $\bar{X} < \bar{X}_0$  باشد، آنگاه  $\text{Cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1)$

(الف) همواره منفی است

(ب) همواره مثبت است

(ج) بستگی به  $(\hat{\beta}_0)^2 \sigma^2$  دارد.

(د) بستگی به  $(\hat{y})^2 \sigma^2$  دارد.

- مدل رگرسیون  $E(y) = 2 + 3x_1 + 4x_2$  را در نظر بگیرید و فرض کنید  $S_x = 4$  ،  $S_y = 4$  ،  $\bar{x} = 10$  و  $\bar{y} = 20$  باشند.  
عرض از مبدأ مدل رگرسیونی استاندارد شده کدام است؟

- (د) ۴ (ج) ۲ (ب) ۱ (الف) ۰

- در یک طرح کاملاً تصادفی با ۴ گروه مداخله و ۵ نکوار، درجه آزادی خطابرابر است با:

- (د) ۳ (ج) ۱۵ (ب) ۱۶ (الف) ۱۸

- در آزمون  $H_0: \mu = 100$  در مقابل  $H_1: \mu > 100$  برای توزیع نرمالی که انحراف معیار آن ۱۲ و سطح معنی‌داری  $0.05$  است اگر  $n = 36$  و  $\bar{x} = 106$  باشد، مقدار احتمال (p-value) چقدر است؟

- (الف)  $0.01 < p < 0.05$   
(ب)  $0.05 < p < 0.1$   
(ج)  $p > 0.1$   
(د)  $p < 0.01$

- یک نمونه  $n$  تایی بدون جایگذاری از جامعه‌ای به حجم  $N$  انتخاب می‌کنیم احتمال اینکه عضو معینی از جامعه در این نمونه باشد برابر است با:

- (د)  $\binom{N-1}{n-1}$  (ج)  $\frac{\binom{N-1}{n-1}}{N}$  (ب)  $\frac{\binom{N}{n}}{N!}$  (الف)  $\frac{n}{N}$

- در مدل رگرسیونی  $y_{ij} = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \varepsilon_{ij}$  که در آن  $x$  دور سر و  $y$  وزن نوزادان است اگر مقیاس اندازه‌گیری دور سر را از سانتی‌متر به میلی‌متر تغییر دهیم، آنگاه برآورد شبیه خط رگرسیونی استاندارد نشده و استاندارد شده، به ترتیب چه تغییری خواهد یافت؟

- (الف) کاهش - بدون تغییر  
(ب) افزایش - افزایش  
(ج) کاهش - کاهش  
(د) افزایش - بدون تغییر

- در مدل رگرسیونی حاصل از روش حداقل مربعات، شبیه خط نمودار  $e$  در برابر  $\hat{y}$  برابر است با:  
(د)  $R^2 - 1$  (ب)  $R^2$  (ج)  $R^2$  تعديل شده (الف) صفر

- در مدل رگرسیونی  $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon$  با  $n = 31$  مقدار  $SSE = 280$  بدست آمد. در مدل کاهش یافته  $y = \beta_0^* + \beta_1^* x_1 + \varepsilon$  مقدار  $SSE = 330$  حاصل شد. مقدار آماره آزمون  $H_0: \beta_2 = 0$  برابر است با:

- (د) ۶ (ج) ۲/۵ (ب) ۵ (الف) ۴

- در یک طرح دو عاملی، عامل B درون عامل A آشیانه شده است. در صورتی که هر دو عامل تصادفی باشند، آنگاه مخرج کسر آماره آزمون اثر عامل A برابر است با:

- (د) MSAB (ب) MSB (ج) MSE (الف) MS B(A)

۵۸- برآورد ضریب همبستگی کنдал برای داده‌های زیر برابر است با:

|   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|----|
| x | ۴ | ۳ | ۵ | ۷  |
| y | ۹ | ۷ | ۸ | ۱۱ |

$$\frac{3}{4}$$

$$\frac{5}{7}$$

$$\frac{5}{6}$$

$$\frac{2}{3}$$

۵۹- در تحلیل واریانس یک طرفه:

الف) متغیر مستقل یک متغیر کمی و دارای توزیع نرمال است.

ب) متغیر وابسته یک متغیر کیفی و دارای توزیع دو جمله‌ای است.

ج) متغیر وابسته یک متغیر کمی و دارای توزیع نرمال در هر گروه است.

د) متغیر مستقل یک متغیر کمی و دارای توزیع دو جمله‌ای در هر گروه است.

۶۰- کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟

الف) اگر  $X$  و  $Y$  آشنازدار شده باشد ضریب رگرسیون خطی ساده برابر با ضریب همبستگی پیرسن است.

ب) شب خط رگرسیون خطی ساده  $X$  و  $Y$  همواره با ضریب همبستگی بین این دو متغیر یکسان است.

ج) اگر آزمون مربوط به شب خط رگرسیون خطی ساده  $X$  و  $Y$ ، معنی‌دار نشود هیچ رابطه‌ای بین آنها وجود ندارد.

د) در رگرسیون خطی ساده  $Y$  روی  $X$ ، در سطح خطای مشخص، اگر آزمون شب خط معنی‌دار نشود آزمون مربوط به همبستگی بین این دو متغیر می‌تواند معنی‌دار شود.

۶۱- فرض کنید بخواهیم یک تیم ۳ نفره از بین ۳ پزشک و ۴ پرستار به تصادف انتخاب نماییم، احتمال اینکه این تیم از یک نفر پزشک و ۲ نفر پرستار تشکیل شود برابر است با:

$$\frac{18}{35}$$

$$\frac{1}{35}$$

$$\frac{17}{35}$$

$$\frac{5}{35}$$

۶۲- اگر انحراف معیار چهار عدد  $a, b, c$  و  $d$  مساوی صفر باشد، میانگین و نماینده (مد) چهار عدد  $a, b, c$  و  $d$  برابر است با:

الف) میانگین برابر ۴ و نماینده ۵

ب) میانگین برابر ۴ و نماینده ۳

ج) میانگین برابر ۴ و نماینده ۴

د) میانگین برابر ۵ و نماینده ۵

۶۳- آماره آزمون کلموگروف- اسمرنوف:

الف) از تفاوت بین واریانس‌ها به دست می‌آید.

ب) تابعی از ماقزیموم فاصله عمودی دو تابع است.

ج) تابعی از مینیمم فاصله عمودی دو تابع است.

د) براساس اختلاف میانگین‌ها حاصل می‌شود.

۶۴- برآورد شب خط رگرسیون در کدام حالت دقیق‌تر است؟

الف) واریانس  $Y$  کمترین مقدار ممکن باشد.

ب) واریانس  $X$  کمترین مقدار ممکن باشد.

ج) واریانس  $Y$  بیشترین مقدار ممکن باشد.

د) واریانس  $X$  بیشترین مقدار ممکن باشد.



۶۵- در یک دبستان ۴۰۰ دانش آموز تحصیل می کنند احتمال ابتلاء به یک عارضه خاص برای هر دانش آموز یک درصد می باشد احتمال اینکه در آن دبستان دانش آموزی مبتلا نشود تقریباً برابر است با:

- (د)  $e^{-4}$       (ب)  $4e^{-4}$       (ج)  $1 - e^{-4}$       (الف)  $e^{-4}$

۶۶- برای بررسی تاثیر همزمان جنس و سطح تحصیلات افرادی که به تصادف انتخاب شده‌اند بر ابتلاء به دیابت، کدام یک از روش‌های آماری زیر مناسب‌تر است؟

- (الف) تحلیل واریانس یک طرفه  
(ب) تحلیل کواریانس  
(ج) رگرسیون لوجستیک  
(د) تحلیل واریانس دو طرفه

۶۷- در مدل رگرسیون خطی ساده  $E(y) = \alpha + \beta x$  ، برآورد پارامترهای  $\alpha$  و  $\beta$  در روش حداقل مربعات:

- (الف) کوچک‌تر است.  
(ب) برابر است.  
(ج) بزرگ‌تر است.  
(د) دارای اربیبی مثبت است.

۶۸- برای تشخیص یک عارضه قلبی در گروهی از بیماران از دو روش A و B بطور همزمان استفاده می‌گردد. برای مقایسه دو روش از چه آزمونی استفاده می‌کنیم؟

- (الف) فریدمن  
(ب) ککران  
(ج) دقیق فیشر  
(د) مک نمار

۶۹- جهت برآورده میانگین صفت  $y$  با استفاده از صفت کمکی  $x$  ، در چه شرایطی برآورد نسبتی دقیق‌تر از برآورد رگرسیونی است؟

- (الف) رابطه بین  $x$  و  $y$  ، خطی مستقیم باشد و از مبدأ مختصات بگذرد.  
(ب) رابطه بین  $x$  و  $y$  ، خطی مستقیم باشد و از مبدأ مختصات نگذرد.  
(ج) رابطه بین  $x$  و  $y$  غیرخطی باشد و از مبدأ مختصات بگذرد.  
(د) رابطه بین  $x$  و  $y$  غیرخطی باشد و از مبدأ مختصات نگذرد.

۷۰- کدام یک از آزمون‌های زیر برای مقایسه یک متغیر کمی غیرنرمال در چند جامعه وابسته استفاده می‌شود؟

- (الف) کروسکال والیس  
(ب) فریدمن  
(ج) من ویتنی  
(د) لون

## زبان عمومی

### Part One: Vocabulary

Complete the following sentences, choosing the most appropriate option (a, b, c, or d).

- 71- When a person ..... a foreign language, she learns it well and communicates easily.
- a) conveys
  - b) ignores
  - c) masters
  - d) certifies
- 72- Last week, the patient felt better, but yesterday her condition ..... ; she is in a critical state.
- a) deteriorated
  - b) remitted
  - c) aggregated
  - d) recovered
- 73- Recent studies have suggested that ovarian cancer patients could ..... from immunotherapy.
- a) generate
  - b) derive
  - c) procure
  - d) benefit
- 74- Vaccines work by making the body produce antibodies to fight a disease without actually ..... us with the disease.
- a) proposing
  - b) offering
  - c) infecting
  - d) fortifying
- 75- Treatment might be ineffective without ..... the source of a disease.
- a) recognizing
  - b) complying with
  - c) conforming with
  - d) concealing
- 76- The survivors of the accident were asked questions to see if they were able to ..... certain events which happened in the past.
- a) anticipate
  - b) estimate
  - c) recall
  - d) release
- 77- Many medical lecturers are used to ..... preparing before their classes; they never lecture .....
- a) spontaneously
  - b) convincingly
  - c) appropriately
  - d) abundantly
- 78- The ultimate aim of healthcare system must be complete ..... of social injustice in medical come.
- a) promotion
  - b) enhancement
  - c) distribution
  - d) eradication
- 79- Around three quarters of women in early pregnancy experience ..... which is a feeling of sickness in the stomach.
- a) anxiety
  - b) fatigue
  - c) nausea
  - d) stroke
- 80- Individuals are encouraged to ..... their lifestyle and adopt healthier behaviors.
- a) defend
  - b) modify
  - c) compromise
  - d) intimidate

- 81- The Flu virus is so ..... that many people infected with it have to be hospitalized.
- a) virulent      b) subjective      c) credible      d) objective
- 82- People should not rely on such traditional practices since they are not only unacceptable but also ..... .
- a) substantial      b) advantageous      c) promising      d) deleterious
- 83- In reporting the scientific results, researchers should be ..... and do not involve their personal views.
- a) biased      b) inattentive      c) skeptical      d) impartial
- 84- In a two-hour surgery, the surgeon was eventually able to ..... tumor cells connected to the bones.
- a) dislodge      b) infest      c) ingest      d) congest
- 85- Simple vitamin D deficiency rickets results from insufficient intake of vitamin D and inadequate ..... to sunlight.
- a) presentation      b) exposure      c) manifestation      d) disclosure
- 86- There are some home remedies which are preferred by people as they are better at ..... some types of pain.
- a) contributing to      b) speeding up      c) alleviating      d) boosting
- 87- Some diseases are very difficult to ..... in the early stages since no signs or symptoms develop.
- a) abandon      b) diagnose      c) promote      d) collapse
- 88- In modern problem-solving teaching ....., medical students are more active than their teachers.
- a) committee      b) approach      c) evaluation      d) reliance
- 89- The studies conducted by the research team have ..... good results so that there is a hope for controlling the symptoms of psoriasis.
- a) yielded      b) diminished      c) eliminated      d) quitted
- 90- While new medical ..... have benefited mankind, they have created complex legal and ethical issues.
- a) complications      b) expectations      c) drawbacks      d) achievements

## Part Two: Reading Comprehension

Read the following passages carefully, and then answer the questions that follow. Base your answers on the information in the passages only.

### Passage 1

People have long been concerned about the cancer-causing potential of microwaves, which at a distance are harmless, but when close to the head could be more alarming. Numerous animal studies indicate the potential damage to human cells from the sort of radio waves that cell phones or "mobiles" emit. Cancer specialists, however, feel there is no clear scientific evidence to date that cell phones are linked to brain cancer. Meanwhile, if you are uneasy about using your mobile phone, here are some precautions:

- Keep your conversation short, using conventional phones for longer talks
- Choose a cell phone with an antenna directed away from the head
- Try to avoid using cell phones in buildings and cars, since that requires a stronger signal
- And last, try a headset, with the phone strapped to your waist. This keeps the antenna away from your head and your precious brain

**91- For a long time, a common cause of people's worry has been the .....**

- a) effects of microwaves on mobile communications
- b) brain cancer caused by using cell phones
- c) studies conducted on cancer-causing phones
- d) abundance of microwaves in residential areas

**92- According to the passage, radio waves emitted by cell phones .....**

- a) are avoidable at close range
- b) are harmless in buildings and cars
- c) may lose their cancer-causing potential if kept at a distance
- d) affect animals more extensively as compared to humans

**93- Studies conducted on animals have .....**

- a) failed to prove that mobile waves cause brain cell damage
- b) advised people against any exposure to microwaves
- c) rejected the previous studies on the effects of microwaves
- d) confirmed the results of earlier researches on the matter

**94- The text recommends that people .....**

- a) use their cell phones only outside the buildings
- b) continue using mobile in a conventional manner
- c) contract the strong signals of their phones
- d) use mobiles cautiously and only when they have to

95- It is stated that, while driving, the mobile phone should be .....

- a) connected to an antenna
- b) used as little as possible
- c) strapped to the waist
- d) used with weak signals

## Passage 2

Pain management, pain medicine, pain control or algistry is a branch of medicine employing an interdisciplinary approach for easing the suffering and improving the quality of life of those living with chronic pain. The typical pain management team includes medical practitioners, pharmacists, clinical psychologists, physiotherapists, occupational therapists, physician assistants, and nurses. The team may also include other mental health specialists and massage therapists. Pain sometimes resolves promptly once the underlying trauma or pathology has healed, and massage therapists. Pain sometimes resolves promptly once the underlying trauma or pathology has healed, and is treated by one practitioner, with drugs such as analgesics. Effective management of chronic (long-term) pain, however, frequently requires the coordinated efforts of the management team.

Medicine treats injury and pathology to support and speed healing, and treats distressing symptoms such as pain to relieve suffering during treatment and healing. When a painful injury or pathology is resistant to treatment and persists, when pain persists after the injury or pathology has healed, and when medical science cannot identify the cause of pain, the task of medicine is to relieve suffering. Treatment approaches to chronic pain include pharmacological measures, such as analgesics, antidepressants and anticonvulsants, interventional procedures, physical therapy, physical exercise, application of ice and/or heat, and psychological measures, such as biofeedback and cognitive behavioral therapy.

96- A suitable title for the passage above could be .....

- a) pain-killer alternatives
- b) chronic pain management
- c) pain medicine
- d) pain management team

97- The branch of medicine employing the approach to control pain is referred to as .....

- a) analgesia
- b) pain etymology
- c) pain practice
- d) algistry

98- According to the passage, cognitive behavioral therapy is considered a kind of ..... for controlling pain.

- a) physical therapy
- b) treatment approach
- c) pharmacological measures
- d) occupational therapy

99- If the cause of pain cannot be identified by medical procedures, .....

- a) the doctor tries to reduce the patient's suffering or distresses
- b) the patient should be referred to a physiotherapist
- c) the patient should be limited to heat and ice therapy
- d) massage therapists, rather than pharmacologists, are beneficial

100- According to the passage, chronic long-term pain .....

- a) needs cooperation of the team members of pain management
- b) resolves immediately after treating the underlying trauma
- c) is an interdisciplinary branch of science
- d) persists after the injury or pathology has healed

### Passage 3

Surgical patients are typically advised to get plenty of bed rest following operations for obvious reasons. Resting is usually necessary because many patients find themselves weakened by the surgery and in pain or discomfort. Too much physical activity can also mean risk of injury. However, Dr Sharon, a professor at Harvard Medical School, points out that immobility can also be "tremendously hazardous to the health and postoperative recovery of older patients." for this reason, "enhanced recovery after surgery" (ERAS) guidelines suggest that post operation patients who are able to be active, do more standing and walking around after surgery as soon as they can. This is particularly helpful for older patients, who can sometimes develop pneumonia after surgery, because standing and walking helps them to use their lungs more. Research has shown that it also helps patients to regain bowel function more quickly and can even reduce the need for pain medication.

101- The writer uses the terms "regain bowel function more quickly" to indicate the beneficial effects of post operation mobility on .....

- a) pain medication
- b) use of lungs
- c) pneumonia problem
- d) feces discharge

102- "Resting" in the second sentence, seems to be ..... by surgically-induced weakness.

- a) rejected
- b) avoided
- c) compromised
- d) justified

103- The ERAS guidelines are expected to ..... a delay in suitable post operation activities.

- a) be in favor of
- b) go up against
- c) underestimate
- d) recommend

104- The underlined "This" refers to .....

- a) postoperative recovery
- b) enhanced recovery
- c) standing and walking
- d) immobility

105- The text discusses ..... post-operation bed rest.

- a) two different views on
- b) advantages of immobility for
- c) resistance to immobility for
- d) shortcomings of Dr. Sharon's views on

#### Passage 4

According to a new study, mutations in genes that occur spontaneously may contribute to congenital heart disease in children. These mutations may contribute to about 10 percent of cases of congenital heart disease in children, which is the most common type of birth defect in the United States. About 40.000 babies are born each year with congenital heart disease.

While some chromosomal abnormalities (such as Down syndrome) and infection during pregnancy are known to cause congenital heart disease, the new study shows that spontaneous gene mutations during fetal development affect the development of brain and heart, and may lead to congenital heart disease in children with healthy parents.

In the study, researchers looked at the rate of spontaneous mutations in 362 children with severe congenital heart disease, 264 healthy children and parents of both groups.

Although children in both groups had about the same number of spontaneous mutations, the locations of those mutations were markedly different in the two groups. "The mutations in patients with congenital heart disease were found much more frequently in genes that are highly expressed in the developing heart," said study researcher Christine Seidman, a Howard Hughes Medical Institute investigator. This finding provides insights for future research, and may someday lead to better treatment options, the researchers said.

**106- The commonest inborn condition in American children is .....**

- a) birth defect
- b) heart disease
- c) gene mutation
- d) chromosomal abnormality

**107- Spontaneous gene mutations in children with severe congenital heart disease and in the healthy ones were found to be .....**

- a) almost the same
- b) of different rates
- c) similar in number
- d) depending on their parents

**108- According to the passage, every year spontaneous gene mutations in fetuses result in roughly ..... cases of congenital heart disease.**

- a) 4000
- b) 362
- c) 264
- d) 40000

**109- The investigators hope their research contribute to ..... in future.**

- a) congenital heart disease
- b) the rate of spontaneous mutations
- c) more effective management of heart disease
- d) genes highly expressed in the developing heart

**110- A good title for the passage is .....**

- a) American babies suffering from heart disease
- b) spontaneous gene mutations linked to children's heart defects
- c) congenital heart disease among American babies
- d) pregnancy chromosomal abnormalities and heart defects

موفق باشد

# کلاس های آمادگی

موسسه علوم پزشکی سنا

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

پیسانس به پزشکی

[www.sanapezeshki.com](http://www.sanapezeshki.com)

ندوه برگزارها:

حضور کا (در تهران و بیش از ۸۰ نمایندگی)

غیر حضور کا (وب کنفرانس در سراسر کشور)



اساتید انحصاری

در موسسه علوم پزشکی سنا



دکتر ذکری

(ژنتیک پزشکی)




دکتر بشاش

(بیوشیمی و زیست شناسی (هماتولوژی و ایمنی شناسی)  
سلولی و مولکولی)



دکتر جعفر نژاد

(بیوشیمی و زیست شناسی (هماتولوژی و ایمنی شناسی)  
سلولی و مولکولی)



دکتر لطافت نژاد

(مدیریت خدمات بهداشتی)



دکتر موسوی

(مدیریت خدمات بهداشتی)



دکتر نادری

(شیمی آلی و عمومی)



استاد پور غلام

(پرسنلی)



استاد صادقی  
(فیزیک پزشکی)



دکتر تقی زاده  
(زبان)



دکتر روحی  
(زبان)



دکتر بیگی  
(اقتصاد سلامت)



# درخواست از امتحان

دوره حضوری آزمون ارشد پزشکی ۹۸ از ۱ مرداد (میدان انقلاب)

| نام دسته               | نام استاد      | نام پرسش                |
|------------------------|----------------|-------------------------|
| پنجشنبه                | دکتر جعفر نژاد | بیوشیمی کد ۱            |
| چهارشنبه ها            | دکتر جعفر نژاد | بیوشیمی کد ۲            |
| جمعه ها                | دکتر جعفر نژاد | زیست شناسی              |
|                        |                | سلولی و مولکولی         |
| پنجشنبه ها             | دکتر بشاش      | هماتولوژی               |
| جمعه ها                | دکتر بشاش      | ایمنی شناسی             |
| پنجشنبه ها             | دکتر ذکری      | رنتیک پزشکی             |
| پنجشنبه ها             | استاد رجبی     | ایمنی شناسی کد ۲        |
| پنجشنبه ها             | گروه استادی    | تغذیه                   |
| چهارشنبه ها            | استاد پور غلام | پرستاری                 |
| چهارشنبه ها            | گروه استادی    | مامایی*                 |
| شنبه ها و یکشنبه       | گروه استادی    | اتفاق عمل*              |
| چهارشنبه ها (۸ تا ۱۳)  | استاد صادقی    | فیزیک هسته ای و اتمی*   |
| چهارشنبه ها (۱۵ تا ۲۰) | استاد صادقی    | فیزیک عمومی*            |
| پنجشنبه ها (۱۵ تا ۲۰)  | دکتر نادری     | شیمی آلی و عمومی*       |
| پنجشنبه و جمعه         | گروه استادی    | مجموعه روانشناسی بالینی |
| پنجشنبه و جمعه         | گروه استادی    | مدیریت خدمات بهداشتی    |
| جمعه ها (۸ تا ۱۳)      | دکتر روحی      | زبان ارشد کد ۱          |
| شنبه ها (۱۵ تا ۲۰)     | دکتر تقی زاده  | زبان ارشد کد ۲          |
| چهارشنبه ها (۱۵ تا ۲۰) | دکتر یوزی      | زبان ارشد کد ۳ *        |
| چهارشنبه ها (۱۵ تا ۲۰) | دکتر روحی      | زبان ارشد کد ۴ *        |

- کلاس هایی که علامت \* دارند بر اساس شرکت کنندگان و استاد قابل تغییر می باشد  
برای مشاهده سایر کلاس ها و زمانبندی ترم پاییز، به سایت موسسه مراجعه فرمایید.

## افواح دوره ها در موسسه علمی پزشکی سنا با حضور اساتید قرآنی کشور

| نام دوره                      | از مون ارشد و دکتری<br>لسانیس به پزشکی<br>هزارب بینداشت | از مون ارشد و دکتری<br>ترم تابستان<br>ثبت نام: خرداد، تیر<br>شروع دوره: مرداد | دوره تشریحی<br>(پایه تا پیشرفته) |
|-------------------------------|---|---|----------------------------------|
| دوره پاییز                    | ترم پاییز<br>ثبت نام: تابستان و مهر<br>شروع دوره: آبان  | ترم پاییز<br>ثبت نام: تابستان و مهر<br>شروع دوره: آبان                        | دوره تشریحی<br>(پایه تا پیشرفته) |
| دوره نکته و تست               | ثبت نام: دی و بهمن<br>شروع دوره: فروردین                | ثبت نام: زمستان<br>شروع دوره: فروردین   | دوره سوالات احتمالی              |
| دوره رفع اشکال                | ثبت نام: دی و بهمن<br>شروع دوره: فروردین                | ثبت نام: زمستان<br>شروع دوره: فروردین   | دوره رفع اشکال                   |
| همایش جمع بندی<br>(یک روزه)   | زمان برگزاری:<br>دو هفته مانده به آزمون                 | زمان برگزاری:<br>دو هفته مانده به آزمون                                       | همایش جمع بندی<br>(یک روزه)      |
| همایش انتخاب دانشگاه          | -   | زمان برگزاری:<br>پس از اعلام نتایج اولیه                                      | همایش انتخاب دانشگاه             |
| همایش انتخاب رشته<br>(رایگان) | -   | اواسط مرداد<br>اواسط شهریور<br>اواسط مهر                                      | همایش انتخاب رشته<br>(رایگان)    |

**حضوری تهران:** میدان انقلاب  
**مکان برگزاری:** حضوری شهرستان: در بیش از ۸۰ نمایندگی  
**غیرحضوری:** وب کنفرانس در سایت موسسه

## تفصیل ویژه برای ثبت نام کنندگان درخواست از امتحان:

یک جلسه مشاوره رایگان توسط استاد اصلی سنا  
۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف ثبت نام کامل آزمون های کشوری سنا !!

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵

sanapezeshki.com



# نرم افزار لایتner تلفن همراه



قابل استفاده برای تمامی دروس علاوه بر زبان

امکان تلفظ برای لغات انگلیسی

امکان اضافه کردن، ویرایش یا حذف یک کارت

امکان جستجو بین کارت‌ها استفاده به عنوان دیکشنری یا دایره المعارف

امکان اشتراک کارت‌های خود با دوستان قابلیت ایمپورت و اکسپورت

مشاهده اخبار داغ علوم پزشکی در صفحه اصلی نرم افزار

بسته‌های با ارزش تهیه شده برای این برنامه:

+ لغات پرترکار در آزمون ارشد وزارت بهداشت پیشفرض نرم افزار

+ لغات کتاب زبان انگلیسی برای دانشجویان پزشکی پیشفرض نرم افزار

+ لغات مشابه ظاهري پیشفرض نرم افزار

+ کتاب ۵۰۴ واژه پیشفرض نرم افزار

+ کتاب لغات ضروری برای تافل پیشفرض نرم افزار

# آزمون‌های آزمایشی کشوری

## حضوری و غیرحضوری

هرچند اخیراً برخی موسسات با الفاظی همچون "بالاترین جامعه آماری" سعی در ایجاد روانی برای جذب مخاطبین به سمت خود می‌باشد ولی به گواهی بسیاری از پذیرفته شدگان سال‌های قبل، رقابت در آزمون‌های پزشکی سنا بدليل حضور اکثریت رقباً حکایت دیگری است! شاید رتبه شما در کارنامه‌های ساختگی برخی موسسات در نگاه اول به شما انژری زیادی بدهد ولی حتماً خودتان هم از ته دل به رتبه ظاهراً خوب خود اطمینان نخواهید داشت! موسسه علوم پزشکی سنا به عنوان اولین برگزار کننده آزمون‌های آزمایشی کشوری در حوزه پزشکی از سال ۸۷ می‌باشد که هر ساله با بیشترین تعداد شرکت کننده در سراسر کشور و هم‌زمان بصورت حضوری در شعبات تمام استان‌ها و بصورت ایترنی (غیرحضوری) برگزار می‌گردد.

طبق تجربه چند سال اخیر رتبه‌های ۱ تا ۵ آزمون‌های آزمایشی سنا، معمولاً در کنکور، رتبه‌ای بین ۱ تا ۱۵ را کسب می‌کنند که این خود گواهی بر حضور اکثریت رقبای شما در آزمون‌های سنا است.

حال شما کدام را انتخاب می‌کنید؟ آزمون‌های کشوری سنا با بیش از ۱۵ سال اعتبار و کیفیت، یا آزمون‌های ارزان قیمت موسساتی که هنوز نیامده ادعای بالاترین آمار را دارند...

## ویژگی‌های آزمون‌های آزمایشی سنا

+ آمار واقعی بیشترین تعداد شرکت کننده از سراسر کشور

+ برگزاری بصورت حضوری و ایترنی با صدور کارنامه باهم و به تفکیک

+ برگزاری بصورت مراحل طبقه‌بندی و جامع

+ برگزاری آزمونهای حضوری در تمامی استان‌ها

+ برگزاری آزمونهای ایترنی بصورت آفلاین [ارسال پاسخ در طول ۲ روز]

+ رفع اشکال پس از آزمون توسط رتبه‌های برتر سال قبل

+ طراحی سوالات استاندارد طبق آخرین آزمون وزارت بهداشت

+ تیم طراحی سوال با حضور استادی بنام و رتبه‌های برتر

+ پاسخهای کامل‌ا تشریحی به همراه نکات آموزشی

+ کارنامه کشوری با کاملترین آنالیزهای آماری

+ اعلام رتبه کشوری شما برای هر درس و در کل دروس

+ امکان تغییر شعبه آزمون در صورت تغییر مکان شما

+ امکان تبدیل آزمون حضوری به ایترنی در روز قبل از آزمون

# کلاس حضوری و غیرحضوری

چه کسانی به کلاس نیاز دارند؟

افرادی که در دانشگاه خود، از کیفیت آموزشی بالایی برخوردار نبوده و یا به دلیل تغییر رشته برای اولین بار با مطالب تخصصی رشته همچنان مهندسی هفتگی می‌شوند، به منظور تهییم بیشتر مطالب، نیازمند کلاس‌های منظم هفته‌ی داده و حضور در کلاس و مشاهده رقباً، به آنها انرژی مضاعفی می‌دهد و یا افرادی که از زمان فارغ التحصیلی آنها مدت زیادی گذشته است می‌توانند از دوره‌های حضوری نهایت استفاده را نمایند.

موسسه علوم پزشکی سنا با در اختیار داشتن برترین اساتید علوم پزشکی در حیطه آزمون‌های وزارت بهداشت، دیگر هیچ بهانه‌ای برای عدم قبولی شما در دانشگاه دلخواه شما نخواهد گذاشت.

- بیوشیمی، زیست‌علومی و مولکولی: دکتر اکبر جعفریزاد

- ریتمیک پزشکی: دکتر ذکری

- همایولوژی: دکتر بشاش

- شیمی: دکتر نادری

- پرستاری: استاد پورغلام

- روانشناسی بالینی: دکتر غضنفری، استاد امیری

- مدیریت بیمارستان: دکتر موسوی، دکتر لطفت‌نژاد

- اقتصاد بهداشت: دکتر بیگی

- فاماپی: استاد پاکزاد و استاد کرمی

- زبان: دکتر تقی زاده، دکتر روحی، دکتر یوزی

...

جهت اطلاعات بیشتر در مورد سایر اساتید، شهریه کلاس‌ها و روزهای برگزاری در طول هفته با شماره‌های دفتر مرکزی تماس گرفته و یا به آدرس زیر مراجعه نمایید:

[sanapezeshki.com/class](http://sanapezeshki.com/class)

# بسته‌های آموزشی

↳ پیشش کامل کتب رفنس اعلام شده و اعلام نشده!

↳ بروزرسانی جزوایت همراه با آخرین تغییرات

↳ تلیپ شده و با ظاهر جذب

↳ استفاده از معلمات تدریسی اساتید عضو بود

↳ وان آزمون‌های خودسنجی طبقه‌بندی شده



جهت اطلاعات بیشتر در مورد جزوایت موجود، قیمت و نحوه سفارش (تلفنی یا ایترنی) با شماره‌های دفتر مرکزی تماس گرفته و یا به آدرس زیر مراجعه نمایید:

[sanapezeshki.com/jozveh](http://sanapezeshki.com/jozveh)



جهت دانلود نرم افزار و بسته‌های تخصصی به آدرس زیر مراجعه کنید:

[sanapezeshki.com/leitner](http://sanapezeshki.com/leitner)

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کرده و یا با شماره‌های موسسه در شهر یا استان خود تماس برقرار نمایید:

[sanapezeshki.com/azmoon](http://sanapezeshki.com/azmoon)